

CVIČENIE 6.

Lokálne extrémy funkcie viacerých premenných.

Definícia. Nech $f : A \subset R^2 \rightarrow R$ je funkcia definovaná, na množine A .

Hovoríme, že funkcia f má v bode $a = [x_0, y_0]$:

- lokálne minimum,
ak $\exists O_\delta(a)$ také, že $\forall [x, y] \in O_\delta(a)$ platí $f(x, y) \geq f(x_0, y_0)$,
- lokálne maximum,
ak $\exists O_\delta(a)$ také, že $\forall [x, y] \in O_\delta(a)$ platí $f(x, y) \leq f(x_0, y_0)$.

V prípade ostrých nerovností hovoríme o ostrom lokálnom minime resp. maxime.

Veta (o nutnej podmienke). Nech $f : A \subset R^2 \rightarrow R$ je diferencovateľná funkcia na množine A .

Ak f má v bode $a = [x_0, y_0]$ lokálny extrém, tak

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) = 0, \quad \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) = 0.$$

Definícia. Nech $f : A \subset R^2 \rightarrow R$ je diferencovateľná funkcia na množine A .

Bod $a = [x_0, y_0]$, v ktorom

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) = 0, \quad \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) = 0,$$

nazývame stacionárny bod.

Veta (o postačujúcej podmienke).

Nech $f : A \subset R^2 \rightarrow R$ je dvakrát diferencovateľná funkcia na množine A a nech bod $a = [x_0, y_0]$ je stacionárny bod.

Ak druhý diferenciál funkcie f , $d^2 f(a, h, k) = f''_{xx}(a)h^2 + 2f''_{xy}(a)hk + f''_{yy}(a)k^2$ je

- kladne definitný, tak bod a je bod ostrého lokálneho minima,
- záporne definitný, tak bod a je bod ostrého lokálneho maxima,
- indefinitný, tak bod a nie je bod lokálneho extrému.

Veta. Sylvestrovo kritérium.

Nech $f : A \subset R^2 \rightarrow R$ je dvakrát diferencovateľná funkcia na množine A a nech bod $a = [x_0, y_0]$ je stacionárny bod. Nech

$$D = \begin{pmatrix} f''_{xx}(a) & f''_{xy}(a) \\ f''_{yx}(a) & f''_{yy}(a) \end{pmatrix}$$

$$D_1 = f''_{xx}(a)$$

$$D_2 = \det D.$$

Ak

- $D_1 > 0$, $D_2 > 0$, tak bod a je bod ostrého lokálneho minima,
- $D_1 < 0$, $D_2 > 0$, tak bod a je bod ostrého lokálneho maxima,
- $D_2 < 0$, tak bod a nie je bod lokálneho extrému.

Nájdite stacionárne body a body lokálnych extrémov funkcie dvoch premenných ak:

1. $f(x, y) = x^2 + y^2.$
2. $f(x, y) = -x^2 - y^2.$
3. $f(x, y) = x^2 - y^2.$
4. $f(x, y) = 27x^2y + 14y^3 - 54x - 69y.$
5. $f(x, y) = (y - x - 2)^2.$
6. $f(x, y) = xy(\ln(x^2 + y^2)).$
- 7*. $f(x, y) = x^4 + y^4 + 4(x^3 - y^3) + 5(x^2 + y^2) + 4(x - y) - 2xy + 2.$
8. $f(x, y) = 5xy + \frac{25}{x} + \frac{8}{y}$ pre $x > 0, y > 0.$
9. $f(x, y) = -x^2 - xy - y^2 + 6y + 2.$
10. $f(x, y) = e^{-x^2-y^2}(2y^2 + x^2).$
- 10.5 $f(x, y) = e^{x^2+y^2}(2y^2 + x^2).$

Veta. Sylvestrovo kritérium v R^3 .

Nech $f : A \subset R^3 \rightarrow R$ je dvakrát diferencovateľná funkcia na množine A a nech bod $a = [x_0, y_0, z_0]$ je stacionárny bod. Nech

$$D = \begin{pmatrix} f''_{xx}(a) & f''_{xy}(a) & f''_{xz}(a) \\ f''_{yx}(a) & f''_{yy}(a) & f''_{yz}(a) \\ f''_{zx}(a) & f''_{zy}(a) & f''_{zz}(a) \end{pmatrix}$$

$$D_1 = f''_{xx}(a)$$

$$D_2 = \det \begin{pmatrix} f''_{xx}(a) & f''_{xy}(a) \\ f''_{yx}(a) & f''_{yy}(a) \end{pmatrix}$$

$$D_3 = \det D.$$

Ak

- $D_1 > 0, D_2 > 0, D_3 > 0$, tak bod a je bod ostrého lokálneho minima,
- $D_1 < 0, D_2 > 0, D_3 < 0$, tak bod a je bod ostrého lokálneho maxima,
- $D_2 < 0$, tak bod a nie je bod lokálneho extrému,
- $D_i \neq 0$, a znamienka sa striedajú inak, ako v prvých dvoch prípadoch, tak bod a nie je bod lokálneho extrému,

Nájdite stacionárne body a body lokálnych extrémov funkcie troch premenných

11. $f(x, y) = x^2 + y^2 + z^2.$
12. $f(x, y) = -x^2 - y^2 - z^2.$
13. $f(x, y) = x^2 - y^2 + z^2.$
14. $f(x, y) = x^2 + y^2 - z^2.$
15. $f(x, y, z) = xy + yz - \frac{1}{2}(x^2 + y^2) - y - z - 3.$
16. $f(x, y, z) = x^3 + y^2 + z^2 + 12xy + 2z.$
17. $f(x, y, z) = x + \frac{y^2}{4x} + \frac{z^2}{y} + \frac{2}{z},$ pre $x > 0, y > 0, z > 0.$
18. $f(x, y, z) = x^2y^2z^2 - 4x^2 - y^2 - z^2.$
19. $f(x, y, z) = xyz(4 - x - y - z).$

Výsledky

1. $[0, 0]$ je bod ostrého lokálneho minima
2. $[0, 0]$ je bod ostrého lokálneho maxima
3. $[0, 0]$ je sedlový bod
4. $[1, 1]$ je bod ostrého lokálneho minima
 $[-1, -1]$ je bod ostrého lokálneho maxima
5. $[p, p+2] \forall p \in R$ sú body neostrého lokálneho minima.
6. Body $[1, 0], [-1, 0], [0, 1], [0, -1]$ sú sedlové body. Body $[\frac{1}{\sqrt{2e}}, \frac{1}{\sqrt{2e}}], [-\frac{1}{\sqrt{2e}}, -\frac{1}{\sqrt{2e}}]$ sú body ostrého lokálneho minima. Body $[\frac{1}{\sqrt{2e}}, -\frac{1}{\sqrt{2e}}], [-\frac{1}{\sqrt{2e}}, \frac{1}{\sqrt{2e}}]$ sú body ostrého lokálneho maxima.
- 7.
8. Bod $[\frac{5}{2}, \frac{4}{5}]$ je bod ostrého lokálneho minima.
9. $[-2, 4]$ je bod ostrého lokálneho maxima
10. $[0, 0]$ je bod ostrého lokálneho minima, body $[0, 1], [0, -1]$ sú body ostrého lokálneho maxima
- 10.5 $[0, 0]$ je bod ostrého lokálneho minima
11. $[0, 0, 0]$ je bod ostrého lokálneho minima
12. $[0, 0, 0]$ je bod ostrého lokálneho maxima
13. $[0, 0, 0]$ je sedlový bod
14. $[0, 0, 0]$ je sedlový bod
17. $[\frac{1}{2}, 1, 1]$ je bod ostrého lokálneho minima